

Hva bør jeg vite om Xarelto®?

- ◆ Xarelto fortynner blodet, noe som forhindrer at du får farlige blodpropper.
- ◆ Xarelto må tas nøyaktig som legen din har fortalt deg. For å sikre maksimal beskyttelse mot blodpropper må du **aldri hoppe over en dose**.
- ◆ Du må ikke slutte å ta Xarelto uten å snakke med legen din først, fordi det kan øke risikoen for blodpropper.
- ◆ Rådfør deg med helsepersonell dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, før du begynner med Xarelto.
- ◆ Fortell helsepersonell at du bruker Xarelto før kirurgiske inngrep eller andre inngrep.



Når bør jeg rådføre meg med legen min?

Når du tar et blodfortynnende middel som Xarelto er det viktig å være oppmerksom på mulige bivirkninger. Blødning er den vanligste bivirkningen. Ikke begynn å ta Xarelto hvis du vet at du har risiko for blødninger, uten å rådføre deg med legen din først. Ta umiddelbart kontakt med legen din hvis du har noen tegn eller symptomer på blødning, som f.eks.:

- ◆ smerte
- ◆ hevelser eller ubehag
- ◆ hodepine, svimmelhet eller svakhet
- ◆ uvanlige blåmerker, neseblod, blødende tannkjøtt, kuttsår som det tar lang tid før stanser å blø
- ◆ kraftigere menstruasjon eller vaginalblødning enn vanlig

- ◆ blod i urinen som farger den rosa eller brun, rød eller svart avføring
- ◆ opphosting av blod eller oppkast av blod eller oppkast som ligner på kaffegrut

Hvordan skal jeg ta Xarelto®?

- ◆ For å sikre maksimal beskyttelse skal Xarelto
 - 2,5 mg tas med eller uten mat
 - 10 mg skal tas med eller uten mat
 - 15 mg skal tas sammen med mat
 - 20 mg skal tas sammen med mat.



Pasientkort

Xarelto® 2,5 mg

Xarelto® 10 mg

Xarelto® 15 mg

Xarelto® 20 mg

Kryss av i boksen for å angi forskrevet dose

- ◆ **Ha alltid dette kortet med deg.**
- ◆ **Vis alltid frem kortet til lege eller tannlege før du begynner på en behandling.**

Jeg bruker antikoagulasjonsbehandling med Xarelto® (rivaroksaan).

Navn

Andre legemidler/forhold

Adresse

Fødselsdato

Vekt

I nødstilfelle, vennligst informer:

Legens navn

Legens telefon

Legens stempel

Vennligst informer også:

Navn

Telefon

Relasjon

Informasjon til helsepersonell:

- ◆ INR-verdier skal ikke brukes da de ikke er egnet til å måle antikoagulerende aktivitet for Xarelto.